

CALES PODERÍAN SER INDICADORES DE TEA EN MULLERES?

A detección do TEA nas mulleres.
ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE

NA COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL

- Escasa iniciativa de achegamento a outros iguais.
- Comunicación pouco espontánea.
- Dificultade para entender bromas, frases feitas, refráns ou uso literal da mensaxe.
- Dificultades para comprender ou expresarse con xestos.
- Dificultades para facer amizades estables.
- Poden ter dificultades para levar a cabo condutas empáticas con outros, se non son moi evidentes.

A SINTOMATOLOXÍA É MOI DIFERENTE EN MULLERES E HOMES.

ENTRE 140 MIL E 295 MIL NENAS E MULLERES CON TEA EN ESPAÑA

Fonte: INE 2018, ASDEU (Estudo de prevalencia TEA Instituto Carlos III) CDC Center for Disease control and prevalence.

INFLEXIBILIDADE DE PENSAMENTO E DE CONDUTA

- Inflexibilidade nos cambios de rutinas non anticipados.
- Non comparten intereses dos seus iguais.
- Poden ter condutas desinhibidas.
- Imitan aos seus pares de forma mecánica, pouco espontánea.
- Teñen dificultades para resolver conflitos, pedir perdón ou pidan perdón todo o tempo.
- Obsesiós con outras nenas/nenos e adultos da escola.
- Xogo moi repetitivo ou queren dirixir como requisito para xogar.
- Vulnerabilidade en situacíons abusivas ou enganos desde a infancia a vida adulta.
- Poden controlar e esconder as estereotipias e condutas repetitivas.
- Dificultades para xestionar a vida independente: xestión do tempo, destrezas do fogar, laborais, xestión do diñeiro, alimentación, maternidade ou coidado familiar.
- Pasividade ou excesiva angustia ante inxustizas que non teñen gravidade.

PROCESAMIENTO DE ESTÍMULOS

- Alteracións sensoriais que implican dificultades en situacíons sociais.

Podes consultar os recursos da rede da Federación Autismo Galicia en www.autismogalicia.org

